



Вирусы гриппа, циркулирующие среди свиней, которые заразили людей, называют "вар" было установлено с июля 2012 года. (Этот вирус циркулировал среди свиней в США с 2011 года, был обнаружен у свиней во многих государствах, и, по-видимому, широко распространяется среди свиней в США).

Большинство случаев H3N2v отмечалось среди детей, хотя были инфицированы и некоторые взрослые люди, имевшие недавний прямой или косвенный контакт со свиньями. На сегодняшний день почти все случаи инфицирования H3N2v в 2012 году были эпидемиологически связаны с сельскохозяйственными ярмарками - либо с представлением свиней на выставке, либо с посещением свиноферм. Профессиональный контакт со свиньями был зарегистрирован в одном случае инфицирования H3N2v. Ограниченная, неустойчивая передача вируса H3N2v от человека человеку была отмечена в 2011 году, в том числе в домашних хозяйствах и организациях по уходу за детьми. Некоторые больные, инфицированные H3N2v, были госпитализированы, включая ранее здоровых людей и лиц с хроническими основными заболеваниями.

По последним данным (по состоянию на 31.08.2012) число заболевших этим гриппом выросло до 289, заболеваемость регистрируется в 13-ти штатах США, наибольшее число случаев заболеваний зарегистрировано в двух штатах - Огайо и Индиана.

По информации СДС наиболее часто заболевают дети в возрасте до 18 лет. Заболевания протекают преимущественно в легкой форме с симптомами, характерными для сезонного гриппа (лихорадка, кашель, фарингит, ринорея, миалгия и головная боль). К группе риска развития осложнений после гриппа относят детей до 5 лет, взрослых старше 65 лет, страдающих различными хроническими болезнями, и беременных женщин, которым рекомендовано исключить контакт с животными (свиньями) в личных хозяйствах и пребывание на сельскохозяйственных выставках.

ВОЗ прогнозирует умеренный характер эпидемии и не рекомендует вносить изменения в штаммовый состав вакцин на эпидсезон 2012-2013гг.

