

**Лямблиоз**

- часто встречающееся паразита

**Распространенность.** По данным ВОЗ, ежегодно л



**Способ заражения** - фекально-оральный и контактный. Наиболее частый источник заражения - вода, пища, загрязненные цистами лямблий. Лямблии могут передаваться от человека к человеку (в детских коллективах, работники пищевых предприятий и т.д.), при не соблюдении правил личной гигиены. От больного человека во внешнюю среду выделяется более 12 млн цист. Длительность инкубационного периода 1-2 недели.

**Клинически заболевание** характеризуется диареей, тошнотой, рвотой, резкими болями в верхней и средней эпигастральной области, вздутием кишечника, головными болями, потерей в весе, повышением утомляемости.

**Лабораторная диагностика.** Материалом для исследования являют-ся пробы фекалий и дуоденального содержимого.

**Профилактика:**

- соблюдение правил личной гигиены;
- контроль за питанием и водоснабжением;
- обеззараживание воды, в т.ч кипячением;



- обследование на инвазированность лямблиями (детей посещающих ДООУ, детей всех возра

**Лечение:**

используют противопарази

---

***ПОМНИТЕ!*** Не занимайтесь самолечением. При возникновении признаков заболевания, необходимо обратиться к медицинскому работнику для своевременного и полноценного лечения.

ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

□