



О путешествии в далекую тропическую страну наверняка мечтают многие. Перед приездом

По данным Всемирной организации здравоохранения примерно 40 % мирового населения подвергаются риску заболевания малярией.

Ежегодно более 500 миллионов человек болеют малярией в тяжелой



Ежедневно около 20 тысяч человек, посещающих эндемические страны, заражаются этой болезнью. Наиболее опасной является тропическая малярия, от которой умирает около 1% заразившихся.



Ежегодно на территории России регистрируются летальные случаи заболевания от т

В Ростовской области за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3 завозн



Малярия - паразитарная тропическая болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки, анемией и увеличением селезенки. Существует 4 вида малярии: тропическая, трехдневная, четырехдневная и овале-малярия. Наиболее тяжелая - тропическая. Малярия передается от больного человека к здоровому через укусы комаров. Существует и еще два пути заражения при переливании крови и внутриутробный, когда больная малярией женщина заражает своего будущего ребенка. Попавшие, в организм человека во время укуса малярийных комаров паразиты циркулируют в крови, а затем заносятся в печень, в клетках которой и развиваются.



Инкубационный (скрытый) период развития паразитов колеблется от 7-ми дней до 3-

Если отмечается четкое повто



В ряде случаев приступы малярии наступают без озноба. Лихорадка в начале заболевания
ЗАБОЛЕВАНИЕ МАЛЯРИЕЙ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ! ЗАЩИТА ОТ УКУСОВ КОМАРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕДОВОЙ (ОСНОВНОЙ) ЛИНИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ МАЛЯРИИ!

Защита от укусов комаров должна быть предусмотрена как во время пребывания в помещении, так и вне его.

В целях максимальной защиты открытых поверхностей тела от укусов комаров рекомендуется в вечернее время носить одежду с длинными рукавами, брюки, длинное платье светлого цвета, в меньшей мере привлекающего комаров.

После наступления



дуются находиться в помещениях, недоступных д

Химиопрофилактика с помощью противомаларийных препаратов (хинин и премахин) может предупредить заражение людей малярией и предотвратить заболевание. Она должна проводиться всем лицам, выезжающим в эндемичные очаги (туристам, бизнесменам, членам экспедиций и т.д.).

Прием противомаларийных препаратов необходимо начать за неделю до выезда в малярийную местность и затем следует проводить её постоянно, в течение всего времени пребывания в местах возможного заражения малярией и в течение месяца после возвращения из-за рубежа.

Химиопрофилактика проводится под наблюдением врача-инфекциониста.

Вы постоянно должны быть настороже в отношении малярии!



всё. Попробуйте использовать малярийную сетку, чтобы избежать заражения. В случае заболевания малярией обратитесь к врачу.