

Внимание! Сезонная активность клещей!

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (далее – Управление) информирует, что по состоянию на 24 апреля 2018 года в лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось 430 человек, в том числе 158 детей, что не превышает среднемноголетний показатель.

Ведущим механизмом передачи возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, является трансмиссивный (при присасывании зараженных клещей).

Управление предупреждает! При нахождении на опасной в отношении клещей территории надо обеспечивать себе и своим близким защиту от нападения клещей. Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Само- и взаимоосмотры на предмет обнаружения клещей (в том числе ползущих сзади) необходимо проводить каждые 15 – 20 минут. Этот способ может существенно снизить риск присасывания клеща к телу, но полной гарантии он не дает. Необходимо соблюдать особую осторожность, садясь или ложась на траву, поскольку в этой ситуации клещ может прицепиться сразу к верхней части одежды или к голове и заметить его будет трудно.

После возвращения с прогулки следует провести полный осмотр тела и одежды. Следует помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить клеща до того, как он начнет кровососание!

Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить! Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а пока Вы будете ждать, он продолжит вводить в кровь возбудителей болезней.

Управлением проводится комплекс организационных, санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

Борьба с популяциями иксодовых клещей с помощью акарицидов остаётся важной и необходимой частью комплекса профилактических мероприятий и проводится в первую очередь в зонах высокого риска заражения людей клещевыми инфекциями, особенно на территориях пребывания детских контингентов.

Управлением в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» выданы поручения на проведение лабораторных исследований клещей, отобранных в природных биотопах, по результатам которых организуются дополнительные истребительные мероприятия.

В области продолжают проводиться противоклещевые обработки эпидзначимых участков, в том числе пастбищ, зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных животных.

Акарицидные обработки выполнены на площади 4638,52 га, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений – 164,70 га, пастбищ - 1090,5 га; управлением взят на особый контроль вопрос выполнения эффективности противоклещевых работ.

По данным Управления ветеринарии Ростовской области на 24.04.2018 обработками охвачено 434718 голов (104,9%) крупного и 575929 (71,6%) мелкого рогатого скота, обработки продолжаются.